



***Rorippa pyrenaica* (All.) Rchb., 1838 (Fabrice PERRIAT, Essonne, 22/05/2018)**

Espèce nouvelle pour l'Île-de-France

Espèce sans statut en Île-de-France

Le Rorippe des Pyrénées est une brassicacée, qui n'a jamais été mentionnée à notre connaissance dans la région, aussi bien historiquement que de façon contemporaine. Elle a en revanche été citée autrefois à la frontière seine-et-marnaise, dans le Loiret à Dordives (Cosson E. & Germain de Saint-Pierre J., 1861). En 2018, l'espèce a été découverte dans l'Essonne, à Bouray-sur-Juine, dans la vallée de la Juine.

Les populations actuelles les plus proches sont situées dans le Val de Loire, à l'ouest d'Orléans et au méandre de Guilly, ce qui place la station nouvellement découverte en Île-de-France en disjonction d'aire de 80 km vers le nord.

Elle se localise sur une dalle de grès recouverte d'une faible épaisseur de substrat, en compagnie notamment de la Scille d'automne (*Prospero autumnale* (L.) Speta, 1982). Cette écologie plaide en faveur d'une station indigène, même si le site est fréquenté et partiellement anthropisé. Dans la vallée de la Loire (Bourgogne et Centre-Val-de-Loire), elle est connue dans des pelouses sableuses de terrasses alluviales riches en bases, tandis qu'en Auvergne, cette plante affectionne les pelouses sèches à très sèches sur substrats non calcaires.

La station ne comporte que quelques individus regroupés sur moins d'un mètre carré, ce qui la rend très vulnérable. De plus, elle est liée à un milieu fragile et en régression, menacé par la fermeture du milieu (progression des fourrés contigus, piétinement et eutrophisation du fait de la fréquentation humaine) ce qui entraîne d'ores-et-déjà une banalisation du cortège floristique.

Cette espèce mériterait de faire l'objet d'un suivi régulier pour suivre l'évolution de sa population.